

## Wirkungsweise der Fruchtsäure-Behandlung



**Preis € 130,- Dauer ca. 60 Minuten**

### **Wirkungsmechanismus:**

Die menschliche Haut besteht aus Epidermis (Oberhaut), Dermis (Lederhaut) und Subcutis (Unterhaut).

Oberhaut ist wiederum in verschiedene Schichten unterteilt, wobei die Unterhaut ständig neue Hautzellen bildet. Diese wandern allmählich an die Oberfläche der Epidermis und erreichen schließlich die Hornschicht (Stratum Corneum), wo sie als verhornte, abgestorbene Hautzellen abgestoßen werden. Diese Abschuppung findet ständig statt, auch wenn sie meist mit bloßem Auge nicht zu erkennen ist. Abstoßung und Neubildung halten sich bei einer jungen, gesunden Haut die Waage.

Im Alter oder bei Akneerkrankungen kommt es zu einer Anhäufung der toten Hornzellen. Die Haut wird schuppig, stumpf und Mitesser, Pusteln und Fältchen bilden sich.

Die im Belico DEEPEEL enthaltenen Fruchtsäuren vermindern den starken Zusammenhalt der obersten Hautzellen und erleichtern so die Abschuppung. Auf diese Art wird die natürliche Erneuerung der Haut angeregt. Zudem führen die Fruchtsäuren zu einer Feuchtigkeitserhöhung der Haut und zu einer Anregung der Kollagensynthese, was bei einer Anti Age-Behandlung erwünscht ist. Salicylsäure reinigt zudem die Poren und wirkt desinfizierend, was positive Effekte auf Unreinheiten hat.

## Mögliche Nebenwirkungen

**Ernsthafte Nebenwirkungen oder Risiken sind bei Belico DEEPPEEL nicht beobachtet worden.**

Nach der Behandlung können für einige Stunden (selten auch 1 – 2 Tage) Rötungen, Brennen oder ein Wärmegefühl der Haut auftreten, die sich normalerweise rasch zurückbilden. Bei einer entzündlichen Akne kann es vorübergehend zu einer scheinbaren Verschlimmerung durch Abstoßung von Komedonen und Pusteln kommen. Für einige Tage besteht nach dem Peeling eine erhöhte Lichtempfindlichkeit. In den Tagen nach der Behandlung kann es zu einer gewissen Hauttrockenheit oder auch Spannungsgefühlen der Haut kommen.

## **Kontraindikation**

1. empfindliche Haut
2. Couperose, Rosacea
3. Neurodermitis
4. periorale Dermatitis
5. Vitiligo
6. Psoriasis
7. sehr dunkle Hauttypen
8. Neigung zu Narbenbildung
9. akute Hautinfektionen,
10. Herpes Simplex, Hautentzündungen
11. Schwangerschaft und Stillzeit
12. Lichtsensibilisierende Medikamente (**Isotretinoin, Roaccutan, Antibiotika**)
13. Allergie gegen Fruchtsäuren
14. Sonnenexposition 14 Tage vor und 14 Tage nach dem **Belico DEEPPEEL**